℞ Kal. hydrojodici 3ii
Jodi puri 3i
glycerini 3ii

S. Kamforys na nos, usta, gardło.
(Owrzodzenia)

℞ Ac. carbol.
Spir. vini
Tr. jodi aa 4,0
Ol. terebinth. 8,0.
Glycerini 20,0.
S. Zepsuj 2 razy na noc pędzlem
boki ust. (Erysipelas)

℞ Boracis 2,0.
N. bicarbon. 12,0.
S. Kroplówka nosowa (ozena)

℞ N. bicarbonici

S. Прополоскать и минералочкой

горл. кардом 5 минут (5-6 раз) повтор.

(Tonsillit.)

℞ Extr. Aloes 2,0

Extr. Rhei comp 3,0

Pil. sapon. q.s. ut f. pil № 40.

S. Вечером 1, 2, 3 пил. смотря по каловой

коэф. При крайней суетливой и пылкой

кой масст прибавляем

Ex. colocynthidis 0,1 – 0,3.

у анэмичной прибавляем:

ferrum pulv. 1,0.

(запор)

℞ Inf. ipecac. gr vj – ℥ vj
Liq. amm. anis ℥ß
Syr. Senegae ℥ß.
D.S. Utro i vecherom vtoroj (nasch. golovy, nishchemu volch.)

℞ Tr. Capsici anni 15,0.
Ol. ricini 10,0.
Syr. Carend. 10,0.
D.S. Utrom i vecherom vtoroj (nasch. golovy, nishchemu volch.)

℞ Tr. nucis vom.
D.S. По 10 капель на ночь.
(Против икоты)

℞ Kalii bromati
Natr —— aa 2,0
Ammonii —— 1,0
aq. dest. 180,0.
(epilepsia)

℞ Opii pulv. 2,0
Syrup. 25,0
Ol. olivar. 12,0.
D. ung. (ytre in anus)

℞ N. bicarbon 4,0
— Solicyl 1,0
Morph. muriat 0,06
aq. dest 200,0.
D. Dyspnoe 2 p. d. d. 10 Tropfen.
(Inhalatio)

℞ Aq. destil. 200,0
Arg. nitr. 0,06.
D.S. Смазывать суставы.
(для инъекций)

℞ Glycerini 60,0.
D.S. Наружно в разведении 1:1
от ка смазывать ладонь. Inhalatio.
Ладонь пульверизатор Ac. carbol.
(распылительный камень)

℞ But. Cacao 50,0.
Extr. Ratanhiae 4,0.
— Belladonae 2,0.
M.f. Suppositoria N 30
(ректальные)

℞ Chlor. hydrati 4,0
Aq. dest. 180,0.
D.S. По 3 ложки в день.
(обильно)

℞ Liq. alum. acetici ℥ iii
Spir. Ammonii aromat ℥ ss
— vini ℥ iii

Tr. Chinae ℥ ii
Thymoli ℈ ss
ol. Menthae pip gutt x
filtra.

(Nouveaux pr. Kyrsew)

℞ N. bicarbon 4,0
aq. dest
— foeniculi aa 90,0
Tr. nucis vom. gtt vj–x.
S. Teel. 1–2 Theel. no gem. e.

(Ducrucin)

Pulv. i Botkin:

Natr. bicarbon. ℥ j ss
Mag. sulf. ℥ ii ℥ ss
Ac. tartar. ℥ i.